

云南波蚱属二新种记述 (直翅目, 蚱总科, 短翼蚱科)

邓维安¹ 郑哲民² 韦仕珍¹

1. 河池学院化学与生命科学系 广西宜州 546300; dengweian5899@tom.com

2. 陕西师范大学动物研究所 西安 710062

摘要 记述云南波蚱属 *Bolivaritettix* 昆虫 2 新种, 即黑翅波蚱 *Bolivaritettix nigropennis* sp. nov. 及大围山波蚱 *Bolivaritettix dawuishanensis* sp. nov.。模式标本保存于陕西师范大学动物研究所标本室。

关键词 直翅目, 蚱总科, 短翼蚱科, 波蚱属, 新种, 云南。

中图分类号 Q969.26

作者在整理 2005 年 7~8 月采自云南的蚱总科标本时, 发现波蚱属 *Bolivaritettix* 昆虫 2 新种, 记述如下。模式标本保存在陕西师范大学动物研究所标本室。

波蚱属 *Bolivaritettix* 隶属于蚱总科, 短翼蚱科, 由 Günther (1939) 建立 (Günther, 1939), 主要分布于中国、印度、缅甸、印度尼西亚和苏丹等。中国已知 37 种 (Zheng, 2005; Deng and Zheng, 2006), 分布于华东、华南及西南等地区 (Liang and Zheng, 1998; Zheng, 2005)。

属征 体中小型, 头部不突出于前胸背板之上。头顶不突出于复眼之前, 其宽度大于复眼横径, 具中隆线, 颜面略倾斜, 颜面隆起在触角之间弧形突出。触角细长, 着生于复眼下缘之间。复眼圆球形, 不高出于前胸背板之上。前胸背板前缘平截, 与复眼后缘相接或分开; 中隆线明显, 在肩部之间常丘形隆起; 前胸背板后突长锥形, 顶尖; 前胸背板侧片向外扩展, 后角平截。前翅卵形; 后翅发达, 不到达或到达前胸背板后突的顶端。后足跗节第 1、3 节几等长。

黑翅波蚱, 新种 *Bolivaritettix nigropennis* sp. nov.

(图 1~3)

雌性 体小型, 头部不突出于前胸背板之上。头顶宽与复眼横径等宽, 前缘平直, 中隆线明显, 略突出于前缘; 侧面观, 头顶与颜面隆形成钝圆形, 颜面隆起在触角之间弧形突出; 纵沟较狭, 其宽度狭于触角第 1 节的宽度。触角丝状, 着生于复眼前缘下 1/3 处, 15 节, 中段节长为宽的 6~7 倍。复眼圆球形; 侧单眼位于复眼前缘的中部。前胸背板背面光滑, 前缘平直, 中隆线全长明显, 侧面观背板上缘波状; 沟前区侧隆线平行; 肩角圆形, 在肩部之

间具 1 对短纵隆线; 后突长锥形, 到达后足胫节中部, 其超出后足股节顶端部分长约 3 mm, 前胸背板总长为超出后足股节顶端部分长的 4.3 倍; 前胸背板侧片外翻, 后缘具 2 凹陷, 后角钝, 顶平截。前翅长卵形, 顶圆; 后翅发达, 超过前胸背板后突的顶端 1 mm。前、中足股节上、下缘近平直, 中足股节的宽度与前翅等宽; 后足股节粗壮, 长为宽的 3 倍, 上侧中隆线具细齿, 膝前齿及膝齿钝; 后足胫节外侧具 8 枚刺, 内侧具 5 枚刺; 后足跗节第 1 节长于第 3 节 1.4 倍, 第 1 跗节下之 1、2 垫小, 顶尖, 第 3 垫大, 顶钝。产卵瓣狭长, 上瓣之长为宽的 4 倍, 上、下瓣均具细齿。下生殖板长与宽近相等, 后缘中央三角形突出。

体黄褐色; 后翅黑色; 前、中足股节外缘上具 2 个不明显的淡色横斑; 后足股节下缘外侧黑色; 后足胫节黑褐色, 近基部具淡色环。

雄性 体较雌性小, 身体结构和体色同雌性, 中足股足略宽于前翅宽; 下生殖板短锥形。

体长: ♂ 8.8~9.0 mm, ♀ 11 mm; 前胸背板长: ♂ 11.7~12.0 mm, ♀ 13 mm; 后足股节长: ♂ 6.0~6.5 mm, ♀ 7 mm。

正模 ♀, 云南马关 (马白), 1100 m, 2005-07-30, 邓维安采; 副模 5 ♂♂, 邓维安、韦仕珍采, 其它同正模。

新种近似于虎跳峡波蚱 *B. hutiaoxiana* Zheng et Ou, 2003, 主要区别见表 1。

词源: *nigro*, (黑色), *pennis*, (翅), 意指后翅黑色。

大围山波蚱, 新种 *Bolivaritettix dawuishanensis* sp. nov. (图 4~6)

雌性 体小型, 头部不突出于前胸背板之上。




图 1~ 3 黑翅波蚱, 新种 *Bolivaritettix nigropennis* sp. nov., ♀
1. 整体背面 (body, dorsal view) 2. 雌性下生殖板 (♀, subgenital plate) 3. 整体侧面 (body, lateral view)

表 1 黑翅波蚱与虎跳峡波蚱之区别
Table 1. Differences between *Bolivaritettix nigropennis* sp. nov. and *B. hutiaoxiana* Zheng et Ou.

| | |
|---|---|
| 黑翅波蚱, 新种 <i>B. nigropennis</i> sp. nov. | 虎跳峡波蚱 <i>B. hutiaoxiana</i> Zheng et Ou |
| 触角着生于复眼前缘下 1/3 处 | 触角着生于复眼下缘之间 |
| 侧面观背板上缘波状 | 侧面观背板上缘平直 |
| 后翅超过后突顶端 | 后翅到达后突顶端 |
| 中足股节与前翅等宽 | 中足股节明显狭于前翅的宽度 |
| 雌性下生殖板后缘中央三角形突出 | 雌性下生殖板后缘具 3 齿 |

头顶的宽度与复眼横径等宽, 前缘近平直, 中隆线明显; 侧面观头顶与颜面隆起形成钝圆形; 颜面隆起纵沟狭于触角第 1 节的宽度。触角丝状, 15 节, 中段节长为宽的 5~ 6 倍, 触角着生于复眼前缘下 1/3 处。复眼圆球形; 侧单眼位于复眼前缘的中部略上方。前胸背板背面粗糙, 密具大小不等的颗粒; 前缘平直, 中隆线断裂, 侧面观背板上缘成波状; 沟前区侧隆线平行; 肩角钝圆形, 在肩部之间具 1 对短纵隆线; 前胸背板后突长锥形, 到达后足胫节基 1/3 处; 侧片外翻, 后缘具 2 凹陷, 后角顶平截。前

翅长卵形, 顶圆; 后翅发达, 超过后突的顶端, 其超出部分长约 1.5 mm。前、中足股节下缘波状, 中足股节的宽度与前翅近等宽; 后足股节粗壮, 长为宽的 3 倍, 膝前齿及膝齿直角形; 后足胫节外侧具 9 枚刺, 内侧具 7 枚刺; 后足跗节第 1 节长于第 3 节的 1.4 倍, 第 1 节下的第 1、2 垫小, 顶尖, 第 3 垫大, 顶钝。产卵瓣狭长, 上瓣之长为宽的 4 倍, 上、下瓣均具细齿。下生殖板长大于宽, 后缘中央三角形突出。

体暗褐色, 后翅黑色, 后足股节下缘外侧 (同前种) 黑色; 后足胫节黑褐色, 近基部具 1 淡色环。

雄性 体较雌性小, 身体结构和体色同雌性, 中足股足宽于前翅宽; 下生殖板短锥形。

体长: ♂10.5 mm, ♀ 10.5~ 11.0 mm; 前胸背板长: ♂11 mm, ♀ 11.0~ 11.5 mm; 后足股节长: ♂ 6 mm, ♀ 6.5 mm。

正模 ♀, 云南屏边 (大围山), 2 000 m, 2005-07-26, 邓维安采; 副模: 1 ♂, 同正模; 1 ♀, 云南河口 (南溪), 200 m, 2005-07-28, 邓维安采。

新种近似于断隆波蚱 *Bolivaritettix interrupta* Zheng et Jiang 2002 和九万山波蚱 *B. jiuwanshanensis* Zheng

2005, 主要区别见表 2。

词源: 种名以模式产地命名。




图 4~ 6 大围山波蚱, 新种 *Bolivaritettix dawuishanensis* sp. nov., ♀
4. 整体背面 (body, dorsal view) 5. 雌性下生殖板 (♀, subgenital plate) 6. 整体侧面 (body, lateral view)

表 2 大围山波蚱与近缘种之区别

Table 2. Differences among *Bolivaritettix dawuishanensis* sp. nov., *B. interrupta* and *Bolivaritettix jiuwanshanensis*.

| 断隆波蚱 <i>B. interrupta</i> Zheng et Jiang | 大围山波蚱, 新种 <i>B. dawuishanensis</i> sp. nov. | 九万山波蚱 <i>B. jiuwanshanensis</i> Zheng |
|--|---|---------------------------------------|
| 触角着生于复眼前缘下 1/3 处 | 触角着生于复眼前缘下 1/3 处 | 触角着生于复眼下缘之间 |
| 沟前区侧隆线平行 | 沟前区侧隆线平行 | 沟前区侧隆线向后收缩 |
| 侧观背板上缘平直 | 侧观背板上缘波状 | 侧观背板上缘波状 |
| 后突到达后足胫节中部 | 后突到达后足胫节 1/3 处 | 后突到达后足胫节 1/3 处 |
| 前、中足股节下缘平直 | 前、中足股节下缘波状 | 前、中足股节下缘波状 |
| 中足股节狭于前翅的宽度 | 中足股节与前翅等宽 | 中足股节与前翅等宽 |
| ♀ 下生殖板后缘中央三角形突出 | ♀ 下生殖板后缘中央三角形突出 | ♀ 下生殖板后缘具 3 齿 |
| 后足股节下缘外侧黑色 | 后足股节下缘外侧黑色 | 后足股节下缘外侧非黑色 |

REFERENCES (参考文献)

Deng, W A, Zheng, Z-M and Wei, S Z 2006. One new species of Metrodoridae (Orthoptera: Tetrigoidea) from Guangxi, China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 31 (2): 376-377. [邓维安, 郑哲民, 韦仕珍. 广西短翼蚱科一新种记述 (直翅目, 蚱总科). 动物分类学报, 31 (2): 376~ 377]

Günther, K. 1939. Revision der Acrydinae (Orthoptera), III. Sectio Amorphopi (Metrodoridae Bdl. 1887 auct.). *Abhandlungen und Berichte der Museum für Tierkunde und Völkerrunde zu Dresden* (A), 20: 1-335.

Jiang, G F and Zheng, Z M 1998. Grasshoppers and Locusts from Guangxi. Guangxi Normal University Press, Guilin. 1-363 [蒋国芳, 郑哲民. 1998. 广西蝗虫. 桂林: 广西师范大学出版社. 1~ 363]

Liang, G Q and Zheng, Z M 1998. Fauna Sinica, Insecta, Vol. 12, Orthoptera, Tetrigoidea. Science Press, Beijing. 1-278. [梁铭球, 郑哲民. 1998. 中国动物志, 第 12 卷, 直翅目, 蚱总科. 北京: 科学出版社. 1~ 278]

Shishodia, M. S. 1991. Taxonomy and Zoogeography of the Tetrigidae (Orthoptera: Tetrigoidea) of North Eastern India. *Rec. Zool. Surv. India, Occ. Paper.*, 140: 1-203.

Zheng, Z M, Li, K and Shi, F M 2003. A review of the genus *Bolivaritettix* Günther (Orthoptera: Metrodoridae) in China. *Oriental Insects*, 37: 481-490.

Zheng, Z M 2003. Six new species of Tetrigoidea from Dayaoshan Area of Guangxi (Orthoptera). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 28 (1): 88-94. [郑哲民. 2003. 广西大瑶山地区蚱总科六新种记述 (直翅目).

动物分类学报, 28 (1): 88~94]

Zheng, Z M, Shi, F M and Luo, G H 2003. New species of Tetrigoidea from the Region Hongshui River of Guangxi (Orthoptera). *Journal of Huazhong Agricultural University*, 22 (5): 436-441. [郑哲民, 石福明, 罗桂虎, 2003. 广西红水河地区蚱总科的新种 (直翅目). 华中农业大学学报, 22 (5): 436~441]

Zheng, Z M and Jiang, G F 2002. Two new species of *Bolivaritettix* Günther from Jiawan Mountains of Guangxi (Tetrigoidea: Metrodoridae). *Zoosience*, Shaanxi Normal University Press, Xi'an, 102-105. [郑哲民, 蒋国芳, 2002. 广西九万大山地区波蚱属二新种 (蚱总科: 短翼蚱科). 动物科学. 西安: 陕西师范大学出版社. 102~105]

Zheng, Z M and Ou, X H 2003. Three new species of Metrodoridae (Orthoptera: Tetrigoidea) from Yunnan Province. *Entomotaxonomia*, 25

(1): 4-8. [郑哲民, 欧晓红, 2003. 云南省短翼蚱科三新种记述 (直翅目: 蚱总科). 昆虫分类学报, 25 (1): 4~8]

Zheng, Z M and Deng, W A 2004. Six new species of Tetrigoidea from Jincheng River area of Guangxi (Orthoptera: Tetrigoidea). *Journal of Shaanxi Normal University*, 32 (4): 77-83. [郑哲民, 邓维安, 2004. 广西金城江地区蚱科六新种 (直翅目: 蚱总科). 陕西师范大学学报, 32 (4): 77~83]

Zheng, Z M 2005. Fauna of the Tetrigoidea from Western China. Science Press Beijing. 1-501. [郑哲民, 2005. 中国西部蚱总科志. 北京: 科学出版社. 1~501]

Zheng, Z M 2006. Four new species of Tetrigoidea (Orthoptera) from, Yunnan Province, China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 31 (2): 363-368. [郑哲民, 2006. 云南省蚱总科四新种 (直翅目). 动物分类学报, 31 (2): 363~368]

TWO NEW SPECIES OF THE GENUS *BOLIVARITETTIX* GUNTHER (ORTHOPTERA, TETRIGOIDEA, METRODORIDAE) FROM YUNNAN, CHINA

DENG Wei An¹, ZHENG Zhe Min², WEI Shi Zhen¹

1. Department of Chemistry and Life Science, Hechi University, Yizhou 546300, Guangxi, China

2. Institute of Zoology, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China

Abstract This paper reports two new species of the genus *Bolivaritettix* Günther from Yunnan, China. The type specimens are deposited in the Institute of Zoology, Shaanxi Normal University, China.

Bolivaritettix nigropennis sp. nov. (Figs. 1-3)

This new species is allied to *B. hutiaoxiana* Zheng et Ou, 2003, but it differs from the latter in: 1) antennae inserted one third of anterior margin of eyes; 2) in profile, upper margin of pronotum wave-like; 3) hind wings surpassing apex of hind process of pronotum; 4) midfemur as wide as tegmina; 5) middle of posterior margin of female subgenital plate with a triangular process.

Length of body: ♂ 8.8-9.0 mm, ♀ 11 mm.
Length of pronotum: ♂ 11.7-12.0 mm, ♀ 13 mm.
Length of hind femur: ♂ 6.0-6.5 mm, ♀ 7 mm.

Holotype ♀, Yunnan Maguan (Mabai) (23° N, 104.4° E, alt. 1100 m), 30 July 2005, collected by DENG Wei An. Paratypes: 5 ♂♂ collected by DENG Wei An and WEI Shi Zhen, other data same as holotype.

Etymology. The species name is derived from the Latin *nigro* and *pennis*, meaning wings black.

Key words Orthoptera, Tetrigoidea, Metrodoridae, *Bolivaritettix*, new species, Yunnan.

Bolivaritettix daweshanensis sp. nov. (Figs. 4-6)

This new species is similar to *B. interrupta* Zheng et Jiang, 2002 and *Bolivaritettix jiawanshanensis* Zheng, 2005, but differs from the latter in: 1) antennae inserted one third of anterior margin of eyes; 2) lateral keels of prozona parallel; 3) in profile, upper margin of pronotum wave-like; 4) hind process reaching one third of hind tibia; 5) lower margins of fore femur and midfemur wave-like; 6) width of midfemur same as tegmina; 7) middle of posterior margin of female subgenital plate with a triangular process; 8) lower side on out margin of hind femur black.

Length of body: ♂ 10.5 mm, ♀ 10.5-11.0 mm.
Length of pronotum: ♂ 11 mm, ♀ 11.0-11.5 mm.
Length of hind femur: ♂ 6 mm, ♀ 6.5 mm.

Holotype ♀, Yunnan Pingbian (Daweshan) (23.1° N, 103.8° E, alt. 2300 m), 26 July 2005, collected by DENG Wei An. Paratypes: 1 ♂, data as same as holotype; 1 ♀, Yunnan Hekou (Nanxi), alt. 200 m, 28 July 2005, collected by DENG Wei An.

Etymology. The species name refers to the type locality.